

Röntgenonderzoek van de dunne darm

UMC St Radboud

Patiënteninformatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een onderzoek van de dunne darm op de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud. In deze folder staat de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek in grote lijnen beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling Radiologie. U kunt de vragen ook stellen aan de radioloog die het onderzoek uitvoert of de radiodiagnostisch laborant.

Contrastvloeistof

Tijdens het onderzoek wordt een contrastvloeistof gebruikt.

De contrastvloeistof zorgt er voor dat de hele dunne darm tijdens het onderzoek op de monitor te zien is. De radioloog kan kiezen uit een waterig contrastvloeistof en witte bariumpap. De keuze wordt bepaald op de dag van het onderzoek en is (onder andere) afhankelijk van de reden van het onderzoek.

Medicijnen

Medicijnen die de werking van de darmen vertragen mag u tijdens de voorbereiding niet innemen. Andere medicijnen kunt u wel gewoon gebruiken. Dit geldt ook op de dag van het onderzoek.

Zwanger

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u zwanger bent. Als u zwanger bent, neem dan contact op met de behandelend arts. Deze overlegt dan met u of het onderzoek moet doorgaan.

Darmstoma

Neem een extra stomazakje mee voor na het onderzoek.

Diabetes

Diabetici kunnen met vragen over het dieet contact opnemen met de eigen diëtist.

Kleding

Kies voor kleding die u gemakkelijk kunt aan- en uittrekken. Houd er rekening mee dat u tijdens het onderzoek alleen een hemd of T-shirt, onderbroek en sokken kunt aanhouden. Neem voor na het onderzoek extra ondergoed mee.

Vorbereiding

Dag voor het onderzoek

De dunne darm is meestal leeg genoeg voor de contrastvloeistof als u op de dag voor het onderzoek onderstaande voorbereiding volgt en de warme maaltijd tussen de middag neemt en 's avonds de broodmaaltijd.

Eet en drink vanaf het moment dat u opstaat alleen datgene wat in onderstaande lijst staat:

- koffie, thee, limonadesiroop, water, appelsap, druivensap, gezeefd vruchtensap en bouillon.
 - wit brood en beschuit (geen volkoren);
 - boter, margarine en halvarine;
 - vleeswaren, kaas (zonder pitjes of kruiden), gekookt ei, jam zonder pitjes, suiker, vruchtenhagel en honing.
 - heldere bouillon, gekookte aardappelen, aardappelpuree, witte rijst, macaroni en spaghetti;
 - goed gaar gekookte groenten, maar geen koolsoorten, prei, uien, paprika, maïs en peulvruchten;
 - vlees, vis en kip met jus (gebakken, gestoofd of gekookt);
 - appelmoes en fruitcocktail.
- 's Avonds rond 18.00 uur neemt u een broodmaaltijd (zie lijst). Als u de volgende dag 's ochtends een afspraak heeft, mag u na 24.00 uur niets meer eten.

Dag van het onderzoek

- Heeft u 's ochtends een afspraak, dan mag u vanaf 04.00 uur niets meer drinken.
- Is uw afspraak 's middags, dan kunt u 's ochtends voor 08.00 uur een sneetje witbrood met beleg (zie lijst) nemen. Tot 10.00 uur mag u ook nog iets drinken (zie lijst).
- Direct na het onderzoek mag u weer eten. Het is daarom raadzaam om iets te eten van huis mee te nemen.

Onderzoek

Nadat u zich aan de balie heeft gemeld brengt de radiodiagnostisch laborant u naar de kleedkamer. Hier kleedt u zich uit, op uw onderbroek en hemd of T-shirt en sokken na.

In de onderzoekkamer brengt de radioloog een dunne slang via uw neus of mond in de maag. Dit gebeurt meestal terwijl u zit.

Hierna gaat u op de onderzoektafel liggen. De radioloog schuift de slang verder door tot in de dunne darm, en brengt dan via de slang contrastvloeistof in de darm. Door de contrastvloeistof wordt de dunne darm goed zichtbaar.

De radioloog vraagt u afwisselend op de buik en de rug te gaan liggen, zodat van alle delen van de dunne darm

foto's genomen kunnen worden. Nadat de foto's gemaakt zijn gaat de slang eruit. Hierna kunt u naar het toilet. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

Contrastvloeistof

- Van de witte Bariumpap kunt u mogelijk een of twee dagen wat licht gekleurde ontlasting hebben. Heeft u een trage stoelgang, dan kan dit door de bariumpap tijdelijk erger worden. U kunt dit voorkomen door de eerste twee dagen na het onderzoek één tot twee liter per dag extra te drinken.
- Van de waterige contrastvloeistof merkt u na het onderzoek niets, hooguit is de ontlasting wat plakkeriger.

Uitslag

U krijgt de uitslag van de behandelend arts tijdens de vervolgspraak.


Afspraak verzetten

Kunt u op het afgesproken tijdstip niet komen, bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 16.45 uur de helpdesk van de afdeling Radiologie: 024 - 361 45 29.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin aangegeven. Andere mogelijke complicaties worden door de behandelend arts met u besproken.

Noteer hier uw vragen

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write their questions.

Adres

Bezoekadres

Radiologie

UMC St Radboud Centraal

Geert Groteplein 10, route 681

Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 45 29

© *UMC St Radboud*
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie