

Schisis: Pharynxplastiek (verlenging gehemelte)

UMC St Radboud

Patiënteninformatie



In overleg met de behandelend arts van uw kind heeft u besloten tot verlenging van het geheelte. In deze folder vindt u informatie over deze ingreep.

Algemeen

Meestal is uw kind bij de ingreep vier jaar of ouder, soms iets jonger. De opname is vaak in het begin van de week. Uw kind kan dan aan het einde van de week weer naar huis. Informatie over de algemene gang van zaken rond de operatie en het verblijf van uw kind op de verkoeverkamer vindt u in de brochure 'Behandeling en onderzoek onder anesthesie bij kinderen'.

Oproep

Ongeveer een week voor de opname wordt u gebeld over de precieze opnamedatum. Het onderstaande is dan van belang.

- Meld zaken als verkoudheid, koorts, kinderziekten en medicijngebruik. Indien nodig kan de operatie worden uitgesteld.
- Meld aan de afdeling of één van de ouders tijdens de opname bij het kind blijft slapen ('rooming in'), zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

Dag van opname

In de folder 'Verpleegafdeling Zee' leest u wat er deze dag allemaal gaat gebeuren. Het is voor uw kind prettig als u de hele dag kunt blijven.

Dag van operatie

U kunt aangeven of u uw kind wilt begeleiden naar de operatiekamer en aanwezig wilt zijn tot uw kind onder anesthesie is.

De ingreep duurt ongeveer een uur. Na de ingreep heeft uw kind nog pijn en is vaak erg slaperig en misselijk van de anesthesie. Het heeft een infuus en mag in de loop van de dag wat water drinken.

Als pijnstilling wordt viermaal daags een zetpil paracetamol gegeven.

Na de operatie

- De eerste dag na de operatie mag uw kind wat pap eten. Als dat goed gaat wordt het infuus verwijderd. De tweede dag na de operatie mag uw kind gepureerde voeding hebben. Tot twee weken na de operatie moet u op het eten en drinken van uw kind letten. Geprakt warm eten is toegestaan. Harde dingen als brood met korstjes, harde snoepjes en koekjes mag uw kind niet eten.

Ook drinken met een rietje wordt ontraden. Let er ook op dat uw kind geen scherpe voorwerpen in de mond stopt.

- Meestal krijgen kinderen na de ingreep wat temperatuursverhoging en zijn ze wat opstandig. Ook kan uw kind ongeveer twee dagen een gevoelige en stijve nek hebben. Door de zwelling kan een snurkge-luid optreden. Dit kan tot zes weken na de operatie duren.
- De eerste week na de operatie moet uw kind rustig aan doen. Het mag wel naar buiten. De tweede week na de operatie mag uw kind weer naar school. Zwemmen mag na de eerste week.
- De huisarts wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de ingreep.
- In de periode na de operatie kan het zijn dat uw kind onrustig slaapt door de anesthesie. Dit gaat van-zelf over.

Sprekens na de operatie

Al tijdens de eerste dagen na de operatie merken veel ouders een gunstige klankverandering in de spraak op. Het uiteindelijke effect van de operatie kan echter pas na langere tijd (ongeveer drie maanden) worden bepaald, als de weefsels soepel zijn geworden. In het algemeen is het zo dat als een

pharynxplastiek technisch slaagt, er een aanzienlijke vermindering van het luchtverlies via de neus en de open neusspraak wordt bereikt. Al langer bestaande uitspraakfouten kunnen na de operatie beter hoorbaar zijn.

Controle

De hechtingen hoeven niet te worden verwijderd, deze lossen vanzelf op. Zes tot acht weken na de operatie komt u met uw kind bij het Schisisteam op controle. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken (telefoonnummer secretariaat: 024 - 361 69 19).

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling plastische chirurgie (024 - 361 95 94) of de verpleegkundig schisisconsulent (06 - 20303640).

Adres

Bezoekadres

Schisisteam
Gebouw Tandheelkunde
UMC St Radboud West
Philips van Leydenlaan 25,
route 333
2^e verdieping, kamer 267
Nijmegen

Telefoonnummers

Wachtrij uitsluitend dinsdag-
ochtend 10.00 uur:
024 - 361 69 19
Plastische chirurgie:
024 361 76 39



© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie