

Zenuwblokkade door bevroering (Cryoblokkade)

Indicatie

- Pijn die wordt veroorzaakt door een overgevoelige zenuw
- Pijnlijke zenuwknobbel (neuroom)
- Tijdelijke onderbreking van een pijngeleidende zenuw (bijvoorbeeld bij schouderklachten)

Deze pijnlijke plaatsen kunnen overal in het lichaam voorkomen.

Vorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt en onder controle bent bij de trombosedienst, moet u met de arts overleggen of u enkele dagen voor de behandeling met deze medicijnen moet stoppen.

Overgevoeligheid voor verdovingsvloeistof of pleisters graag melden aan de anesthesioloog of verpleegkundige.

Behandeling

Op verzoek van de anesthesioloog wijst u precies de plek aan waar u de pijn voelt. Nadat de huid is gedesinfecteerd krijgt u een injectie met een verdovende vloeistof. Daarna wordt er een holle naald ingebracht tot vlakbij de pijnlijke zenuw. Door deze holle naald wordt een vriesstaafje opgeschoven en vindt de bevroering plaats. De behandeling duurt vijftien tot twintig minuten.

Complicaties/bijwerkingen

- Napijn kan optreden direct na de behandeling op de plaats waar behandeld is en kan soms enkele dagen duren. U kunt hiervoor een pijnstillert nemen (paracetamol).
- Lokale ontstekingsreactie (dit is zeldzaam)

Tenslotte

Afhankelijk van het effect kan deze behandeling worden herhaald als de pijn weer terugkeert. Zorg ervoor dat u na de behandeling naar huis wordt gebracht door een begeleider.

Belangrijk

Uitgebreide informatie leest u in de folder Zenuwblokkade, te verkrijgen bij het Pijnteam UMC St Radboud, telefoon 024 - 685 95 66.

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie

WWW.UMCN.NL