

# Pijnbehandeling: Caudaal injectie

*In overleg met uw specialist van het pijnteam heeft u besloten tot een caudaal injectie. In deze folder vindt u algemene informatie over de caudaal injectie.*

## Vorbereiding

- Indien u bloedverduunners gebruikt kan het zijn dat u deze in overleg met uw behandelend pijnarts tijdelijk moet stoppen.
- Omdat krachtsvermindering in de benen tijdelijk kan optreden is het noodzakelijk dat u met een begeleider naar het ziekenhuis komt en dat u eventueel na de behandeling gebruik maakt van een rolstoel. Een rolstoel kunt u op de polikliniek verkrijgen.
- Wanneer u overgevoelig bent voor jodium, pleisters of verdovingsvloeistof, vertel dit dan voor de behandeling aan de anesthesioloog of verpleegkundige.

- Mocht u de dagen voor de ingreep koorts of griep hebben, wilt u dit dan doorgeven aan de polikliniek pijnbehandeling.

## Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich aan de receptie van de polikliniek pijnbehandeling in Dekkerswald. De medewerker zal u verwijzen naar de operatiekamer waar de behandeling plaats vindt.

## Behandeling

De caudale ruimte bevindt zich helemaal onder aan de wervelkolom, net boven het stuitje. Nadat de huid is gedesinfecteerd, wordt deze verdoofd. Er worden medicijnen in de caudaal ruimte gespoten die de zenuw verdoven. In sommige gevallen wordt er ook een ontstekingsremmend medicijn ingespoten. Tijdens de injectie ligt u op uw buik.

Uw rug wordt afgedekt met steriele doeken. Na de behandeling wordt op de prikplaats een pleister geplakt.

## Nazorg

U kunt pijn ervaren op de plek waar geprikt is. U kunt hiervoor een pijnstiller nemen. De pleister mag u de volgende dag verwijderen.

## Complicaties en bijwerkingen

Na de caudaal injectie kunt u last krijgen van:

- Vocht dat soms een beetje uit de insteekopening lekt.
- Doof gevoel in de benen en /of de schaamstreek. Dit verdwijnt na enige uren als de verdoving is uitgewerkt.
- Krachtvermindering in de benen en/of voeten. Dit is tijdelijk.
- Moeite met plassen. Dit komt soms voor en is van tijdelijke aard.

## Resultaat

Het resultaat van de behandeling is vaak al snel merkbaar. De duur van het pijnstillend effect is niet precies te voorspellen.

## Vervolgafspraken

Na de caudaal injectie bezoekt u de Polikliniek Pijnbehandeling voor een controle of er wordt een afspraak gemaakt voor een telefonische controle. Afhankelijk van het effect kan deze behandeling worden herhaald. Wanneer uw behandeling is afgerond krijgt uw huisarts een brief met de resultaten.

## Belangrijk

Uitgebreide informatie vindt u in de folder 'Zenuwblokkade' verkrijgbaar bij het Pijnbehandelcentrum UMC St Radboud, locatie Dekkerswald. Telefoonnummer 024 - 685 95 66.

© UMC St Radboud  
overname van (gedeelten uit)  
deze tekst is uitsluitend  
mogelijk na schriftelijke  
toestemming van  
Staf Concerncommunicatie

[WWW.UMCN.NL](http://WWW.UMCN.NL)