

Röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders

UMC St Radboud

Patiënteninformatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders (HysteroSalpingoGrafie). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud.

In deze folder wordt de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek in grote lijnen beschreven. Als er na het lezen nog vragen zijn, belt u dan de polikliniek Obstetrie/Gynaecologie of de afdeling Radiologie.

Voorzorgsmaatregelen

In verband met de keuze van het desinfectiemiddel is het nodig dat u voor het onderzoek aan de gynaecoloog doorgeeft of u allergisch bent voor jodium.

Contrastvloeistof

Tijdens dit onderzoek worden met behulp van röntgenstralen en contrastvloeistof de binnenkant van de baarmoeder en eileiders afgebeeld. De contrastvloeistof wordt, via een cupje op de baarmoedermond, ingespoten. Via de eileiders komt een klein gedeelte in de buik.

Vorbereiding

Het onderzoek kan krampen van de baarmoeder, pijn in de rug en onder in

de buik, opwekken. Om deze pijn te verminderen heeft u van de behandelend arts een recept voor pijnstillers gekregen. De pijnstillers haalt u bij de apotheek. U gebruikt de eerste tablet of zetpil de avond voor het onderzoek en de tweede tablet of zetpil ongeveer een uur voor het onderzoek.

Tevens kunt u van de behandelend arts antibiotica voorgeschreven krijgen, deze neemt u de dag voor het onderzoek in. Dit hoeft alleen als er sprake is van antistoffen tegen chlamydia.

Afspraak

U belt op de eerste menstruatiedag tussen 09.00 uur en 12.00 uur naar de polikliniek Obstetrie en Gynaecologie voor het maken van de afspraak voor de hysterosalpingografie (HSG). Mocht uw menstruatie in het weekend vallen, belt u dan maandagochtend. De afspraak wordt gemaakt op een middag tussen de vijfde en twaalfde dag van uw cyclus. Het maken van de afspraak kan enkele minuten duren.

Begeleiding

Tijdens het onderzoek mag u één persoon meenemen. Deze kan naast u blijven staan en proberen u wat af te leiden door met u te praten. Op het moment dat er foto's worden gemaakt moet diegene een loodschoot aantrek-

ken of in de bedieningsruimte gaan staan.

Geadviseerd wordt om iemand mee te nemen, die u ook naar huis kan brengen.

Door de eventuele napijn kunt u misschien niet optimaal aan het verkeer deelnemen.

Dag van het onderzoek

Aangeraden wordt om van boven- en onderlichaam gescheiden kleding te dragen, zoals broek of rok met trui of blouse. Tijdens het onderzoek is het onderlichaam ontbloot. Sokken of pantykousjes kunt u aanlaten.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op afdeling Radiologie (Röntgen 3).

U kunt via de hoofdingang de bordjes Röntgen 3 volgen.

De radiodiagnostisch laborant haalt u uit de wachtkamer op.

In de kleedkamer kleedt u zich van onderen uit. Nadat de gynaecoloog u informatie heeft gegeven over de procedure, gaat u in de onderzoekkamer op het voeteneind van de röntgentafel liggen, met de benen in beensteunen. De gynaecoloog trekt steriele handschoenen aan en gebruikt steriele materialen om infectie te voorkomen. Hij reinigt het gebied rond de vagina met jodium, dit zal koud aanvoelen. Hierna brengt hij een spreider (speculum) in en

maakt hij de baarmoedermond inwendig schoon. De gynaecoloog pakt met een tangetje de baarmoederhals vast, u voelt dan een prikje. Vervolgens drukt hij een cupje stevig tegen de baarmoedermond. Daarna wordt de spreider verwijderd en haalt u uw benen uit de beensteunen. U kunt de benen strekken.

Via het cupje spuit de gynaecoloog de contrastvloeistof in de baarmoeder. Dit kan een korte, hevige pijn onder in de buik en rug geven. De pijn varieert, vooral als blijkt dat de eileiders niet open zijn, kan het pijnlijk zijn.

Wanneer de baarmoeder optimaal gevuld is maakt de radioloog enkele opnamen.

Na het maken van de foto's verwijdert de gynaecoloog het cupje en het tangetje uit de vagina.

De radiodiagnostisch laborant helpt u van de tafel. U kunt zich in een toilet-ruimte wassen en u krijgt een maandverband om de weglekkende contrastvloeistof en de door het tangetje veroorzaakte lichte bloeding op te vangen.

De foto's worden direct beoordeeld en de gynaecoloog geeft u meteen na het onderzoek een voorlopige uitslag.

Soms wordt er na ongeveer vijftien minuten nog een controlefoto gemaakt. Het onderzoek duurt gemiddeld vijftien minuten. In totaal (met de voorbereiding en nazorg) ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Het onderzoek kan krampen van de baarmoeder opwekken. Dit veroorzaakt de pijn onder in de buik en rug.

De eerste dagen na het onderzoek heeft u wat bloedverlies of bruinige afscheiding. Ook kan het onder in de buik gevoelig zijn. Deze verschijnselen gaan vanzelf binnen twee à drie dagen over.

Als de klachten langer aanhouden of heviger worden kunt u contact opnemen met uw gynaecoloog.

Er bestaat geen bezwaar tegen geslachtsgemeenschap en zwangerschap na het onderzoek.

Uitslag

De radioloog en gynaecoloog bestuderen de foto's. Direct na het onderzoek krijgt u een voorlopige uitslag. De definitieve uitslag en het vervolg van de behandeling bespreekt u op de eerstvolgende afspraak met uw behandelend gynaecoloog.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen kunnen alleen in algemene zin worden aangegeven. Mogelijke complicaties worden door de arts met u besproken.

Bericht van verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, bel dan zo spoedig mogelijk de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie, telefoonnummer: 024 - 361 47 89.

Adres

Bezoekadres

Ingang UMC St Radboud Centraal
Röntgen 3, route 780
Geert Groteplein 10
6525 GA Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 45 29

© *UMC St Radboud*
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie