

UMC St Radboud

Huidpriktest

Patiënteninformatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een huidpriktest. Een huidpriktest toont aan of uw lichaam allergisch reageert op bepaalde stoffen. Inademing van deze stoffen kan klachten veroorzaken in de luchtwegen zoals benauwdheid, een verstopte neus met jeuk en niezen of jeukende en ontstoken ogen.

Voorbereiding

De volgende medicijnen mag u drie dagen voor de test niet meer innemen:

Stofnaam	Merksnaam
Acrivastine	Semprex
Alimemazine	Nedeltran
Cetirizine	Zyrtec
Cinnarizine	Cinnipirine
Clemastine	Tavegil
Cyclizine	Marzine
Cyproheptadine	Periactin
Deptropine	Deptropine FNA
Desloratidine	Aerius
Dexchlorfeniramine	Polaramine
Dimenhydrinaa	Dramamine
Dimetidine	Fenistil
Ebastine	Kestine
Fexofenadine	Telfast
Hydroxyzin	Atarax/Navicalm
Ketotifen	Zaditen
Levocetirizine	Xyzal
Loratidine	Claritine/Allerfree
Mebhydroline	Incidal
Meclozine	Suprimal
Mizolastine	Mizollen
Oxatomide	Tinset
Oxomemazine	Doxergan
Promethazine	Phenergan
Terfenadine	Triludan (Forte)

Op de dag dat u getest wordt kunt u beter geen bodylotion of crème op uw armen smeren.

Onderzoek

De polikliniekassistent of verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de onderzoekskamer.

U krijgt twaalf druppels met verschillende soorten allergeen extract op uw onderarm. Om de opname in de huid te bevorderen wordt er een prikje gezet door de druppel tot in de huid. Soms is er aanleiding om u ook te testen op een allergie voor bepaalde voedingsstoffen. In dat geval krijgt u nogmaals zes prikjes.

De reactie kan na vijftien minuten worden afgelezen. Is er een allergische reactie dan ziet men ter plekke een zwelling met een rode hof die ook kan jeuken.

Deze huidreactie lijkt een beetje op een muggenbult.

De uitslag wordt vergeleken met twee controleprikken. De eerste is de negatieve controle. Dit is alleen de oplosvloeistof, er zit dus geen allergeen in. De test is betrouwbaar als hier geen reactie optreedt. De tweede is de positieve controle en bevat een histamineoplossing. Bij de laatste krijgt u zeker een huidreactie die vergeleken kan worden met de reacties op de andere allergenen.

Bijwerkingen

Een reactie op een andere plaats op het lichaam is zeldzaam door de minimale hoeveelheid allergeen die wordt gebruikt. Wel kunt u jeuk verwachten op de arm. Mocht u toch tijdens of na de huidtest last krijgen van niezen, jeuk in de ogen, kortademigheid of andere klachten dan vragen wij u dit direct te melden.

De arts kan dan meteen uw klachten behandelen. In sommige gevallen kan er na ongeveer zes uur opnieuw een jeukende bult verschijnen op de testplaats. Dit kan komen door een sterke allergie. Dit verdwijnt vanzelf weer in de loop van de volgende dagen. Na de test kunt u gewoon uw normale werkzaamheden weer oppakken.

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn na het lezen van deze folder dan kunt u bellen met de verpleegpost van de polikliniek KNO, telefoonnummer 024 - 361 49 40.

Adres

Bezoekadres

Polikliniek Keel-, Neus- en
Oorheelkunde
UMC St Radboud West
Philips van Leydenlaan 15, route 383
Nijmegen

Postadres

UMC St Radboud
383 Polikliniek KNO
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 35 06

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie