

Schisis: lipsluiting en sluiting zachte gehemelte

UMC St Radboud

Patiënteninformatie



In overleg met de behandelend arts van uw kind heeft u besloten tot sluiting van de lipspleet en zachte gehemelte. In deze folder vindt u informatie over deze ingreep.

Algemeen

Meestal is uw kind bij de ingreep zes maanden oud.

De opname is vaak in het begin van de week. Uw kind kan dan na een tot twee dagen weer naar huis.

Informatie over de algemene gang van zaken rond de operatie en het verblijf van uw kind op de verkoeverkamer vindt u in de brochure 'Behandeling en onderzoek onder anesthesie bij kinderen'.

Oproep

Ongeveer een week voor de opname wordt u gebeld over de precieze opnamedatum. Het onderstaande is dan van belang.

- Meld zaken als verkoudheid, koorts, kinderziekten en medicijngebruik. Indien nodig kan de operatie worden uitgesteld.
- Vanaf acht dagen voor de operatie mag het kind niet worden ingeënt.
- Meld aan de afdeling of één van de ouders tijdens de opname bij het kind blijft slapen ('rooming-in'), zo-

dat hiermee rekening kan worden gehouden.

Dag van opname

Als uw kind speciale voeding gebruikt, neem dan de eerste flesvoeding mee.

In de folder 'Verpleegafdeling Het Strand' leest u wat er deze dag allemaal gaat gebeuren.

Het is voor uw kind prettig als u de hele dag kunt blijven.

Tapen

Bij kinderen die voorbehandeld zijn met tape, moet vóór de operatie een driedimensionele foto van het gezicht en een afdruk van de bovenkaak gemaakt worden. Zodra u de datum weet van de operatie kunt u hiervoor zelf een afspraak maken op het schisisteam.

Dag van operatie

De ingreep duurt ongeveer anderhalf uur. De lip en het gehemelte worden gehecht met oplosbaar hechtmateriaal. Na de ingreep heeft uw kind nog pijn. Verder is het vaak erg slaperig en misselijk van de anesthesie. Uw kind heeft een infuus maar mag in de loop van de dag wat water drinken. Als pijnstilling wordt vier maal daags een zetpil paracetamol gegeven.

Na de operatie

Meestal krijgen kinderen wat temperatuursverhoging en zijn ze wat opstandig. Indien nodig kan dan een zetje paracetamol worden gegeven.

De eerste dag na de operatie mag uw kind flesvoeding hebben. Als dat goed gaat wordt het infuus in de loop van de dag verwijderd. Meestal krijgen kinderen wat temperatuursverhoging en zijn ze wat opstandig.

Vanaf de tweede dag mag uw kind weer fruit-en groentehapjes eten, passend bij het gewone voedingsschema en hoeft u geen bijzondere maatregelen meer te treffen. Let op dat er geen scherpe voorwerpen in de mond komen.

Controle

Zes tot acht weken na de operatie komt u met uw kind bij het Schissteam op controle. U maakt hiertoe zelf een afspraak (telefoonnummer secretariaat: 024 - 361 69 19 van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 15.00 uur)

De hechtingen hoeven niet te worden verwijderd, ze lossen vanzelf op. Het kan zijn dat de lip door het nog verse litteken iets optrekt. Dit herstelt zich na enkele maanden. U mag de lip masseren met vaseline.

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling plastische chirurgie (telefoonnummer 024 - 361 95 94) of de verpleegkundig schisisconsulent (telefoonnummer 06 - 20303640).

Adres

Bezoekadres

Schisisteam

Gebouw Tandheelkunde

UMC St Radboud West

Philips van Leydenlaan 25,
route 333

2^e verdieping, kamer 267

Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 69 19

Wachtlijst telefoonnummer:

uitsluitend dinsdagochtend
10.00 uur afdeling Plastische

Chirurgie 024 - 361 76 39



© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie