

Oorzaken baarmoederkanker (endometriumcarcinoom)

Er is een aantal risicofactoren bekend waardoor sommige vrouwen een groter risico op baarmoederkanker kunnen hebben:

- Het risico op het krijgen van baarmoederkanker is iets verhoogd bij vrouwen zonder kinderen, vrouwen met weinig kinderen en bij vrouwen bij wie de overgang laat begint.
- Het risico op baarmoederkanker is groter bij langdurig gebruik van oestrogenen, zoals bij overgangsklachten. Om dit risico te verminderen, worden oestrogenen voorgeschreven in combinatie met een progestativum.
- Tamoxifen is een belangrijk medicijn bij de behandeling van borstkanker. Het gebruik van tamoxifen gedurende een aantal jaren kan het risico op het ontstaan van baarmoederkanker vergroten. De goede behandelingsresultaten van tamoxifen wegen echter zwaarder dan het kleine extra risico op baarmoederkanker. Ook al omdat baarmoederkanker in het algemeen goed te behandelen is. Borstkankerpatienten die tamoxifen gebruiken, worden bij gynaecologische klachten zorgvuldig onderzocht.
- Bepaalde zeldzame oestrogeen producerende tumoren van de eierstokken verhogen het risico op baarmoederkanker.
- Bij vrouwen met overgewicht komt meer baarmoederkanker voor. Waarschijnlijk doordat in het vetweefsel een extra hoeveelheid oestrogene stoffen wordt aangemaakt.