

De dumpingtest

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een dumpingtest te ondergaan. In deze folder leest u de gang van zaken tijdens het onderzoek. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige van de Functieafdeling of uw behandelend arts.

Algemeen

Na een maagoperatie komen in 10-20% van de gevallen klachten voor die het gevolg zijn van een te snelle lediging van voedsel uit de maag naar de darm. Het klachtenpatroon dat door zo'n snelle maaglediging ontstaat wordt ook wel "dumping" genoemd.

Men spreekt van vroege dumping als de klachten binnen een uur na de maaltijd optreden, van late dumping als deze pas na 1 tot 3 uur optreden.

Naast een aantal typische klachten, die vooral optreden na het nuttigen van een koolhydraatrijke maaltijd, wordt ook vaak een versnelling van de pols gezien. Bovendien zijn in sommige gevallen de suikerspiegels in het bloed gestoord en worden de suikers onvoldoende opgenomen door het lichaam. Dit laatste kan worden gemeten door het waterstofgehalte in de uitademingslucht te bepalen. Doel van dit onderzoek is na te gaan of er bij U na een maaltijd sprake is van dumping.

Voorbereiding op het onderzoek

Voor deze "dumpingtest" is het nodig dat u een keer nuchter naar de Functieafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten komt.

U bent nuchter voor vast voedsel vanaf 19.00 uur en voor vloeibaar voedsel vanaf 24.00 uur op de avond voor het onderzoek.

Als u medicijnen gebruikt, kan het nodig zijn om deze tijdelijk te stoppen. U krijgt hiervoor instructies van uw behandelend arts of van de arts van de Functieafdeling.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 3-4 uur.

Plaats van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de Functieafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, Geert Groteplein Zuid 10, Nijmegen. Route 763, zone D1.
Telefoon: 024-3616858.

Uitvoering van het onderzoek

U krijgt een infuus in een arm. Het infuus is nodig om op bepaalde tijden een buisje bloed af te nemen zodat slechts eenmaal geprikt hoeft te worden. Op geregelde tijden, totaal 11 maal, wordt 2 ml. bloed afgenomen.

Aan het begin van het onderzoek krijgt u een afgemeten hoeveelheid van een suikeroplossing in water te drinken (afhankelijk van het lichaamsgewicht, ongeveer 150 ml.). Tijdens het onderzoek vult de verpleegkundige samen met u een lijst in, waarop klachten en verschijnselen genoteerd worden. Het eerste uur zal om de 15 minuten de pols geteld worden.

Verder moet u gedurende het onderzoek om het half uur een keer uitblazen in een spuit, waarin de uitademingslucht wordt opgevangen.

Na het onderzoek

Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Indien u niet opgenomen bent kunt u zonder bezwaar zelf autorijden of met het openbaar vervoer naar huis gaan.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Klachten en bijwerkingen

U moet er rekening mee houden dat het drinken van de suikeroplossing kan leiden tot verschillende klachten zoals misselijkheid, opgeblazen buik, borrelingen, gevoel van warmte, zweten, duizeligheid, hartkloppingen, kortademigheid, slaperigheid en een neiging tot flauwvallen.

Bericht van verhindering

Als u verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk, minimaal 24 uur van tevoren, door op telefoonnummer 024-3616858. Spreek zo nodig uw boodschap in op het antwoordapparaat.

Adres

Bezoekadres

UMC St Radboud
Functieafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten
Ingang Centraal
Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen
Route 763, zone D1

Telefoonnummer

024-361 68 58

Postadres

UMC St Radboud
Huispost 763
Functieafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen